

# HELECHO DE PALITO NEGRO



## NOMBRE CIENTÍFICO

*Adiantum chilense* Kaulf.var. *hirsutum*

## NOMBRES COMUNES

Helecho de palito negro, cüdu-namún (mapudungun), culantrillo.

## FAMILIA

Alstroemeriaceae



## DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT

Especie endémica de Chile. Se distribuye desde la Región de Coquimbo hasta la del Libertador General Bernardo O'Higgins. Es frecuente en las laderas soleadas, acantilados y afloramientos rocosos, de orientación norte.

## FLORACIÓN



E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

## FLORACIÓN

E F M A M J J A S O N D

## CONSERVACION

Sin Amenaza

## DESCRIPCIÓN

Hierba anual, de hasta 1 metro de altura. Ramas estriadas pubescentes. Hojas verde oscuro, pubescentes y aromáticas, su nombre vernáculo proviene del olor que espance similar al almizcle. La forma de la lámina es variable, las inferiores pecioladas y pinnatífidas, las del medio, sésiles y pinnatífidas, y las superiores sésiles, enteras y lineal-lanceolada. Inflorescencia en capítulos dispuestos en panojas laxas. Flores pequeñas, color blanco o rosado, bilabiadas. Fruto, un aquenio cilíndrico con un vilano de pelos diminutos.

## ETIMOLOGÍA

Schinus del griego schinos, nombre del lentisco (*Pistacia lentiscus* L.), debido a la similitud de la fruta y la presencia de resinas. El epíteto *polygamus* deriva del griego *poly*, varios y *gamo*, matrimonio, por la presencia de flores unisexuales y hermafroditas.

## TRADICIONES Y USOS

Su fruto es comestible, se deshidrata para el consumo durante el invierno y también se emplea para preparar chicha. En medicina popular se utiliza como febrífugo, desinflamante, cicatrizante, digestivo y expectorante. Se utilizan los frutos de maqui en forma de compresas externas para el tratamiento de heridas infectadas. El polvo de las hojas secas quemadas, como cicatrizante de heridas. Los frutos pueden ser utilizados para teñir lana.

# HELECHO DE PALITO NEGRO



## DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT

Especie endémica de Chile. Se distribuye desde la Región de Coquimbo hasta la del Libertador General Bernardo O'Higgins. Es frecuente en las laderas soleadas, acantilados y afloramientos rocosos, de orientación norte.

## FAMILIA

Alstroemeriaceae

## NOMBRES COMUNES

Helecho de palito negro, cüdu-namún (mapudungun), culantrillo.

## NOMBRE CIENTÍFICO

*Adiantum chilense* Kaulf. var. *hirsutum*



## FLORACIÓN

E  
F  
M  
A  
M  
J  
J  
A  
S  
O  
N  
D

## CONSERVACION

Sin Amenaza

### DESCRIPCIÓN

Arbusto siempreverde, de hasta 2 metros de altura, bastante ramoso. Sus ramas cubiertas densamente de hojas. Hojas alternas y de forma linear, enteras o con 1 a 4 dientes en el margen. Las flores de color crema están reunidas en capítulos terminales en forma de corimbo; las masculinas y femeninas se encuentran en plantas diferentes. El fruto es un aquenio, madura en otoño. Comúnmente presenta agallas blancas en la punta de las ramas, causadas por un díptero (*Rachiptera limbata*), que deposita sus huevos, rodeado por glóbulos blancos, similar a la plumavit o aislapol

### ETIMOLOGÍA


Baccharis, nombre que deriva de Bacchus (Baco) dios del vino, al parecer porque las raíces de las plantas tendrían un aroma similar al del vino, debido a que es una planta de raíz fragante. El epíteto *linearis* ya que la forma de la hoja es linear.

### TRADICIONES Y USOS

Es utilizada en medicina popular como planta estimulante y antiespasmódica. Externamente se emplea en baños y/o fricciones para tratar en reumatismo. Muy recomendada para restauraciones, en paisajismo muy ornamental por su floración que ilumina el área donde se ubica.



# Helecho de Palito Negro



## DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT

Especie nativa, en Chile crece desde la Región de Coquimbo hasta la de Magallanes. Es parte del bosque esclerófilo, se puede observar dentro del bosque, áreas de transición y terrenos expuestos a sol, siempre que disponga de agua.

## NOMBRES COMUNES

Helecho de palito negro, cūdu-namún (mapudungun), culantrillo.

## NOMBRE CIENTÍFICO

*Adiantum chilense* Kaulf.var. *hirsutum*

FAMILIA

Adiantaceae



**DESCRIPCIÓN**


Helecho herbáceo con rizoma rastrero. Pecíolo café oscuro. Lámina bipinnada a tripinnada; base cuneada y borde crenado. Soros reniformes a algo redondeados en la base, de 1 mm de ancho.

**ETIMOLOGÍA**


Adiantum deriva del griego adiantos, seco, alusión a que los segmentos de las hojas repelen el agua sin mojarse. El epíteto chilensis hace alusión a que es propia de Chile, país donde se colectó.

**TRADICIONES Y USOS**

muy recomendada para uso ornamental en jardines húmedos. En medicina popular se le atribuyen propiedades expectorantes.



# Flor del Gallo



## DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT

Especie endémica de Chile. Crece desde la Región Valparaíso hasta la del Bío Bío. En laderas soleadas.



## NOMBRES COMUNES

Flor del gallo, liuto

## NOMBRE CIENTÍFICO

*Alstroemeria ligtu* L. ssp. *simsii*  
(Sprengel) Bayer

FAMILIA

Alstroemeriaceae

**FLORACIÓN**

E F M A M J J A S O N D

**CONSERVACION**

Sin Amenaza

**DESCRIPCIÓN**

Hierba perenne, provista con rizomas y raíces tuberosas. Tallos de hasta 60 cm. Hojas lanceoladas. Flores dispuestas en cimbras con forma de umbela, cada una con 1 a 4 flores; 3 tépalos externos sin manchas, de color anaranjado y 3 tépalos internos superiores con manchas, de esta manera atrae a los polinizadores. Fruto, una cápsula con semillas esféricas y rugosas en su interior.

**ETIMOLOGÍA**

El nombre genérico *Alstroemeria*, en honor a Claus de Alstroemer (1736-1794), Canciller de Gotemburgo, quien fue uno de los primeros recolectores de Linneo. El epíteto *liuto*, deriva de su nombre vernáculo liuto.


**TRADICIONES Y USOS**

debido a la belleza y duración de sus flores, es una especie muy apreciada como planta ornamental y de corte. Planta conocida por el "Chufio de liuto" o "Chufio de Concepción", elaborado de la fécula contenida en las raíces tuberosas.





# Litre



## DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT

Especie endémica de Chile. Se distribuye desde la Región de Coquimbo a la de Bío Bío. Presenta una amplia distribución y es una especie dominante en el matorral de la zona central.

## NOMBRES COMUNES

Litre, lithi, liti, lite, lithe

## NOMBRE CIENTÍFICO

*Lithraea caustica* (Molina) Hook. & Arn.



FAMILIA

Anacardiaceae



**FLORACIÓN**E  
F  
M  
A  
M  
J  
J  
A  
S  
O  
N  
D**CONSERVACION**

Sin Amenaza

**DESCRIPCIÓN**

Árbol siempreverde de hasta 6 m de altura. Corteza de color gris oscuro. Las hojas son simples, alternas y coriáceas, de forma ovalada. Fácil de reconocer ya que presentan la nervadura amarilla que contrasta con el verde lustroso de la lámina. Flores de color pardamarillento, dispuestas en panoja. El fruto es una drupa amarillenta a gris pardo, comprimida, brillante y lisa, del tamaño de una pimienta.

**ETIMOLOGÍA**


Lithraea, deriva de su nombre vernáculo lithe, (del mapuzungun lithe; árbol de mala sombra). El epíteto caustica, debido a su efecto irritante, que provoca en las personas inflamaciones cutáneas.

**TRADICIONES Y USOS**

La madera es dura y se la emplea en construcción de embarcaciones, de ejes de carreta y estribos. También ha sido explotado para la obtención de carbón. Los frutos eran empleados para hacer miel y algunas bebidas dulces. Es una especie reconocida por su efecto irritante.



# Huingán



## DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT

Especie nativa, crece en Chile, Brasil, Uruguay, Argentina y Perú. En nuestro país se distribuye desde la Región de Atacama hasta la Región de los Ríos.



## NOMBRES COMUNES

huingán, wingan, rihen, boroco, borocoi, muchi

## NOMBRE CIENTÍFICO

*Schinus polygamus* (Cav.) Cabrera

FAMILIA

Anacardiaceae

FLORACIÓN



**DESCRIPCIÓN**

árbol o arbusto de hasta 2 m de altura. Sus ramas terminan en punta de aguijón. Las hojas son alternas, oblongas a espatuladas. Inflorescencia en racimos axilares, con flores de color amarillento. El fruto es una drupa globosa, brillante, de color violeta o negro-azulado.

**ETIMOLOGÍA**

Schinus del griego schinos, nombre del lentisco (*Pistacia lentiscus* L.), debido a la similitud de la fruta y la presencia de resinas. El epíteto polygamus deriva del griego poly, varios y gamo, matrimonio, por la presencia de flores unisexuales y hermafroditas.

**TRADICIONES Y USOS**

De sus bayas violáceas se elabora una miel. En medicina popular se emplean las hojas para curar las nubes de los ojos y para lavar heridas.

CONSERVACION



# *Moscharia pinnatifida*

## HELECHO DE PALITO NEGRO



### DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT

Especie endémica de Chile, crece desde la Región de Coquimbo hasta la del Libertador General Bernardo O'Higgins. Se ubica en laderas expuestas al sol.

### NOMBRES COMUNES

Huilli, huille, cebollín, cebolleta.

### NOMBRE CIENTÍFICO

*Leucocoryne ixioides* (Hook.) Lindl.

FAMILIA

Liliaceae



## FLORACIÓN

E F M A M J J A S O N D

## CONSERVACION

Sin Amenaza

### DESCRIPCIÓN

Hierba perenne, bulbosa. Hojas lineares de hasta 30 cm., de longitud. Inflorescencia en umbela, de hasta 12 flores de color blanco a violeta, 6 tépalos, 3 estaminodios de forma cilíndrica o aplanada, estilo corto. Fruto, una cápsula trivalva con semillas de color negro.

### ETIMOLOGÍA

Leucocoryne deriva de leuco, blanco y coryne: mazo, alude a la forma y color de los estaminodios. El epíteto ixioides, alude a la similitud con Ixia, otro género.

### TRADICIONES Y USOS

por la belleza de sus flores, es una especie muy recomendada para uso ornamental.



# HELECHO DE PALITO NEGRO

## NOMBRE CIENTÍFICO

*Adiantum chilense* Kaulf.var. *hirsutum*

## NOMBRES COMUNES

Helecho de palito negro, cüdu-namún (mapudungun), culantrillo.

## DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT

Especie endémica de Chile. Se distribuye desde la Región de Coquimbo hasta la del Libertador General Bernardo O'Higgins. Es frecuente en las laderas soleadas, acantilados y afloramientos rocosos, de orientación norte.



FAMILIA Alstroemeriaceae



**FLORACIÓN**

E  
F  
M  
A  
M  
J  
J  
A  
S  
O  
N  
D

**CONSERVACION**

Sin Amenaza

**DESCRIPCIÓN**

Arbusto siempreverde, de hasta 2 metros de altura, bastante ramoso. Sus ramas cubiertas densamente de hojas. Hojas alternas y de forma linear, enteras o con 1 a 4 dientes en el margen. Las flores de color crema están reunidas en capítulos terminales en forma de corimbo; las masculinas y femeninas se encuentran en plantas diferentes. El fruto es un aquenio, madura en otoño. Comúnmente presenta agallas blancas en la punta de las ramas, causadas por un díptero (*Rachiptera limbata*), que deposita sus huevos, rodeado por glóbulos blancos, similar a la plumavit o aislapol

**ETIMOLOGÍA**

Baccharis, nombre que deriva de Bacchus (Baco) dios del vino, al parecer porque las raíces de las plantas tendrían un aroma similar al del vino, debido a que es una planta de raíz fragante. El epíteto *linearis* ya que la forma de la hoja es linear.

**TRADICIONES Y USOS**

Es utilizada en medicina popular como planta estimulante y antiespasmódica. Externamente se emplea en baños y/o fricciones para tratar en reumatismo. Muy recomendada para restauraciones, en paisajismo muy ornamental por su floración que ilumina el área donde se ubica.



# HELECHO DE PALITO NEGRO

*Adiantum chilense* Kaulf.var. *hirsutum*

FAMILIA Astromeriaceae



## DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT

Especie endémica de Chile. Se distribuye desde la Región de Coquimbo hasta la del Libertador General Bernardo O'Higgins. Es frecuente en las laderas soleadas, acantilados y afloramientos rocosos, de orientación norte.

## OTROS NOMBRES COMUNES

Helecho de palito negro, cūdu-namún (mapudungun), culantrillo.



# HELECHO DE PALITO NEGRO

*Adiantum chilense* Kaulf.var. *hirsutum*



FAMILIA Astromeriaceae

## DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT

Especie endémica de Chile. Se distribuye desde la Región de Coquimbo hasta la del Libertador General Bernardo O'Higgins. Es frecuente en las laderas asoleadas, acantilados y afloramientos rocosos, de orientación norte.

## OTROS NOMBRES COMUNES

Helecho de palito negro, cūdu-namún (mapudungun), culantrillo.



# HELECHO DE PALITO NEGRO

*Adiantum chilense*



FAMILIA  
Liliaceae

## NOMBRES COMUNES

Huilli, huille, cebollín, cebolleta.

## NOMBRE CIENTÍFICO

*Leucocoryne ixioides* (Hook.) Lindl.

## DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT

Especie endémica de Chile, crece desde la Región de Coquimbo hasta la del Libertador General Bernardo O'Higgins. Se ubica en laderas expuestas al sol.



# HELECHO DE PALITO NEGRO

*Adiantum chilense*

## DESCRIPCIÓN

Arbusto siempreverde, de hasta 2 metros de altura, bastante ramoso. Sus ramas cubiertas densamente de hojas. Hojas alternas y de forma linear, enteras o con 1 a 4 dientes en el margen. Las flores de color crema están reunidas en capítulos terminales en forma de corimbo; las masculinas y femeninas se encuentran en plantas diferentes. El fruto es un aquenio, madura en otoño. Comúnmente presenta agallas blancas en la punta de las ramas, causadas por un díptero (*Rachiptera limbata*), que deposita sus huevos, rodeado por glóbulos blancos, similar a la plumavit o aislapol

## ETIMOLOGÍA

Baccharis, nombre que deriva de Bacchus (Baco) dios del vino, al parecer porque las raíces de las plantas tendrían un aroma similar al del vino, debido a que es una planta de raíz fragante. El epíteto *linearis* ya que la forma de la hoja es linear.

## TRADICIONES Y USOS

Es utilizada en medicina popular como planta estimulante y antiespasmódica. Externamente se emplea en baños y/o fricciones para tratar en reumatismo. Muy recomendada para restauraciones, en paisajismo muy ornamental por su floración que ilumina el área donde se ubica.

FLORACIÓN



CONSERVACION

Sin Amenaza

# HELECHO DE PALITO NEGRO

*Adiantum chilense*



FAMILIA  
Liliaceae

## NOMBRES COMUNES

Huilli, huille, cebollín, cebolleta.

Huilli, huille, cebollín, cebolleta.

## NOMBRE CIENTÍFICO

*Leucocoryne ixioides* (Hook.) Lindl.

*Leucocoryne ixioides* (Hook.) Lindl.

## DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT

Especie endémica de Chile, crece desde la Región de Coquimbo hasta la del Libertador General Bernardo O'Higgins. Se ubica en laderas expuestas al sol.

## TIPO



Hierbas



# HELECHO DE PALITO NEGRO

*Adiantum chilense*

## DESCRIPCIÓN

Hierba perenne, bulbosa. Hojas lineares de hasta 30 cm., de longitud. Inflorescencia en umbela, de hasta 12 flores de color blanco a violeta, 6 tépalos, 3 estaminodios de forma cilíndrica o aplanada, estilo corto. Fruto, una cápsula trivalva con semillas de color negro.

## ETIMOLOGÍA

Leucocoryne deriva de leuco, blanco y coryne: mazo, alude a la forma y color de los estaminodios. El epíteto ixioides, alude a la similitud con Ixia, otro género.

## TRADICIONES Y USOS

Por la belleza de sus flores, es una especie muy recomendada para uso ornamental.

## ESTADO DE CONSERVACION

Sin Amenaza

## MESES DE FLORACIÓN



# HELECHO DE PALITO NEGRO

*Adiantum chilense*

FAMILIA Alstroemeriaceae



## NOMBRES COMUNES

Huilli, huille, cebollín, cebolleta.

## NOMBRE CIENTÍFICO

*Leucocoryne ixioides* (Hook.) Lindl.

## DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT

Especie endémica de Chile, crece desde la Región de Coquimbo hasta la del Libertador General Bernardo O'Higgins. Se ubica en laderas expuestas al sol.



# Moscharia pinnatifida

## HELECHO DE PALITO NEGRO

Liliaceae

FAMILIA

---

### NOMBRE CIENTÍFICO

*Leucocoryne ixioides* (Hook.) Lindl.

---

### NOMBRES COMUNES

Huilli, huille, cebollín, cebolleta.

---

### DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT

Especie endémica de Chile, crece desde la Región de Coquimbo hasta la del Libertador General Bernardo O'Higgins. Se ubica en laderas expuestas al sol.





# Moscharia pinnatifida

HELECHO DE PALITO NEGRO

FAMILIA Liliaceae



## NOMBRE CIENTÍFICO

*Leucocoryne ixioides* (Hook.) Lindl.

.....

## NOMBRES COMUNES

Huilli, huille, cebollín, cebolleta.

.....

## DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT

Especie endémica de Chile, crece desde la Región de Coquimbo hasta la del Libertador General Bernardo O'Higgins. Se ubica en laderas expuestas al sol.

.....

## TIPO

# Moscharia pinnatifida

HELECHO DE PALITO NEGRO

Liliaceae

FAMILIA



## NOMBRE CIENTÍFICO

*Leucocoryne ixioides* (Hook.) Lindl.

## NOMBRES COMUNES

Huilli, huille, cebollín, cebolleta.

## DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT

Especie endémica de Chile, crece desde la Región de Coquimbo hasta la del Libertador General Bernardo O'Higgins. Se ubica en laderas expuestas al sol.

## COLORACION



## TIPO



# Moscharia pinnatifida

## HELECHO DE PALITO NEGRO

### DESCRIPCIÓN

árbol o arbusto de hasta 2 m de altura. Sus ramas terminan en punta de aguijón. Las hojas son alternas, oblongas a espatuladas. Inflorescencia en racimos axilares, con flores de color amarillento. El fruto es una drupa globosa, brillante, de color violeta o negro-azulado.

### ETIMOLOGÍA

Schinus del griego schinos, nombre del lentisco (*Pistacia lentiscus* L.), debido a la similitud de la fruta y la presencia de resinas. El epíteto *polygamus* deriva del griego *poly*, varios y *gamo*, matrimonio, por la presencia de flores unisexuales y hermafroditas.

### TRADICIONES Y USOS

De sus bayas violáceas se elabora una miel. En medicina popular se emplean las hojas para curar las nubes de los ojos y para lavar heridas.



CONSERVACION  
Sin Amenaza

### TIPO DE HOJA

Oblonga



### DISPOSICIÓN HOJA

Fasciculadas



### INFLORESCENCIA

Solitaria

